

Behandelovereenkomst

De heer/mevrouw.....,

Verklaart na overleg met de behandelende oogarts, aangaande refractiechirurgische behandeling, het volgende:

- 1. Ermee bekend te zijn dat deze ingreep door de wetgever beschouwd wordt als medische ingreep.**
- 2. Van te voren de noodzaak van de aangevraagde behandeling goed te hebben overwogen.**
- 3. Volledig op de hoogte te zijn gebracht door de behandelende oogarts en zijn medewerkers van de betekenis en de inhoud van de ooglaserbehandeling de risico's die aan een dergelijke ingreep verbonden zijn, en begrepen te hebben dat tijdens of na de behandeling complicaties kunnen optreden, zoals infecties. Ik heb kennis genomen van de bijlage van deze overeenkomst.**
- 4. Te hebben begrepen dat het resultaat van de behandeling niet met honderd procent zekerheid te voorspellen is en dat de kans bestaat dat er in de toekomst toch nog een bril gedragen zal moeten worden. Verder heb ik ook begrepen dat de behandeling niet zal leiden tot het voldoen aan keuringseisen.**
- 5. Te hebben begrepen dat de ingreep niet meer ongedaan gemaakt kan worden en dat ontevredenheid over het resultaat niet zonder meer verplichting oplevert voor de oogarts om een eventuele tweede behandeling uit te voeren. Indien mogelijk zal de oogarts tot 5 jaar na de behandeling een eventuele herbehandeling kosteloos uitvoeren. In deze periode zullen ook alle oogcontroles zonder kosten worden uitgevoerd.**
- 6. Volledig te zijn ingelicht over het feit dat plaatselijke verdoving of algemene narcose (alleen bij implant-lenzen) risico's met zich meebrengt.**

7. Van mening te zijn antwoord gekregen te hebben op alle vragen die naar aanleiding van de uit te voeren ingreep bij mij gerezen zijn.
8. Van mening te zijn dat de wensen, die aan gaande de behandeling door mij zijn geuit, door de oogarts goed zijn afgewogen en dat aan mij voldoende duidelijk is gemaakt in hoeverre met mijn wensen rekening kan worden gehouden.
9. Te erkennen alle door mij gewenste documentatie en informatie over deze ooglasersbehandeling te hebben ontvangen en begrepen.
10. Ik heb begrepen, dat na de operatie medische nazorg zal worden verleend.
11. Op de hoogte te zijn, dat het slagingspercentage van mijn refractiechirurgische behandeling neerkomt op:

_____ %

Op grond van het bovenstaande ben ik tot het weloverwogen besluit gekomen de refractiechirurgie/eximerlasersbehandeling te willen ondergaan en geeft hierbij toestemming de behandeling uit te voeren.

Hoofddorp, dd.....

Handtekening patiënt:

Handtekening oogarts:

Bijlage bij Behandelovereenkomst Complicaties LASIK/LASEK

Mij is bekend dat er tijdens de oogheekkundige behandeling complicaties kunnen ontstaan. Deze zijn in 2 categorieën in te delen.

I. Complicaties die het gezichtsvermogen aantasten. (Geheel of gedeeltelijk verlies van het gezichtsvermogen is mogelijk).

A. Dit kan veroorzaakt worden door een ooginfectie (uit- of inwendig), die niet met antibiotica of andere middelen genezen kan worden.

B. Ongelijkmatige genezing, zwelling, of littekenvorming op het hoornvlies (voorste lamel) kunnen een dusdanige vervorming van het hoornvlies veroorzaken, dat ook met behulp van een bril of contactlenzen mijn gezichtsvermogen niet meer hersteld kan worden tot de toestand van voor de LASIK- of LASEK-behandeling.

C. Het is mogelijk dat een onbedoelde perforatie van het hoornvlies gehecht moet worden of een cornea transplantatie vereist. Door een perforatie en zelfs cataract (staar) ontstaan.

D. De voorste lamel van de cornea kan onherstelbaar worden beschadigd, zodat donor cornea weefsel nodig kan zijn om het gezichtsvermogen te herstellen.

E. De voorste lamel van de cornea kan na de operatie verkeerd gaan liggen of verloren gaan, wat resulteert in een slecht gezichtsvermogen en/of astigmatisme. Dit kan aanvullend operatief ingrijpen vereisen om de lamel te herplaatsen. Het is mogelijk dat ook na deze aanvullende ingreep mijn gezichtsvermogen slechter is dan vóór de LASIK- of LASEK-behandeling.

F. De 'Microkeratoom' kan slecht functioneren zodat de operatie gestaakt moet worden. De operatie moet dan later herhaald worden of aanvullend chirurgisch ingrijpen kan nodig zijn.

G. Verdere complicaties en risico's kunnen onder andere zijn: hoornvlieszwelling, hoornvliesbeschadiging, netvliesloslating, bloedingen, veneuze en arteriële blokkades, glaucoom, cataractvorming, totale blindheid en zelfs verlies van het oog.

II. Complicaties die het gezichtsvermogen niet aantasten.

(Elke patiënt heeft korte tijd last van minstens een paar van deze complicaties).

- A. Er kan ongelijkmatig of gelijkmatig astigmatisme ontstaan. Hierdoor kan mijn gezichtsvermogen achteruitgaan. Met een bril zal dit niet verbeteren.
- B. Ik kan verziend worden (door overcorrectie). Deze verziendheid kan permanent zijn. Dit komt het meest voor bij mensen ouder dan 40 en kan het permanent of incidenteel dragen van een bril bij het lezen of zelfs bij verziën noodzakelijk maken. Dit kan in de loop van de tijd erger worden ('hyperopic shift').
- C. Ik heb begrepen, dat mijn gezichtsvermogen misschien niet geheel hersteld wordt door de LASIK- of LASEK en dat dit in de toekomst eventueel chirurgisch verbeterd moet worden door bijvoorbeeld Radiale Keratotomie, Astigmatische Keratotomie of, als de behandelend arts dit onverstandig vindt, het gebruik van een bril of contactlenzen.
- D. Toename van lichtgevoeligheid, schittering, en wisselingen in gezichtsscherpte kunnen optreden. Deze verschijnselen houden gewoonlijk gedurende de stabilisatieperiode van één tot drie maanden aan, maar kunnen ook permanent zijn.
- E. 's Nachts kan een stervormig- of halo-effect bij lichtbronnen optreden. Gewoonlijk neemt dit na verloop van tijd af, maar het verschijnsel kan ook permanent worden.
- F. Er kan een refractieverschil tussen de twee ogen optreden (anisometropie), waardoor grootte en positie van voorwerpen anders lijken. Een begeleidend 'schaduw-' of 'fantombeeld' is mogelijk, dat het bepalen van afstanden en diepte zien bemoeilijkt.
- G. Het oog kan kwetsbaarder worden. Ik begrijp dat oogbescherming vereist is bij activiteiten die risico's voor beschadiging van het oog inhouden, zoals bv. Zwemmen, tennissen, squashen, softballen en karate. Een harde klap op het oog kan verlies van dat oog tot gevolg hebben.
- H. Naarmate we ouder worden, worden de oogleden slapper; deze gaan daardoor meer hangen. Een oogoperatie, waaronder LASIK- of LASEK, kan dit proces versnellen.
- I. Er kan pijn optreden, vooral gedurende de eerste acht- en-veertig uren na de operatie. Tevens kunnen mijn ogen gedurende een aantal uren gaan tranen.